GEOLOGISCHE KARTE VON BAYERN 1 : 25 000

Herausgegeben vom Bayerischen Landesamt für Umwelt

Geologische Aufnahme: ULRICH TEIPEL & ERNST KROEMER 2003-2005
unter Berücksichtigung von Unterlagen von G. FISCHER (1937)
unter Mitwirkung von J. ROHRMÜLLER

Bundesrepublik Deutschland
6742 Cham Ost

Geologische Karte

Geologische Karte von Bayern
1 : 25 000
6742
Cham Ost

Bayerisches Landesamt für Umwelt



6641 Rötz	6542/6642 Untergrafenried/ Waldmünchen	6543/6643 Furth i. Wald
6741 Cham West	**6742 Cham Ost**	6743 Neukirchen b. Hl. Blut
6841 Roding	6842 Miltach	6843 Bad Kötzting

Bayerisches Landesamt für Umwelt
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
http://www.lfu.bayern.de

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)

Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Telefon: (08 21) 90 71 – 0
Fax: (08 21) 90 71 – 55 56
E-Mail: poststelle@lfu.bayern.de
Internet: www.lfu.bayern.de

Digitale Kartographie: A. Schröder

Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung
http://www.geodaten.bayern.de
Topographische Karte 1 : 25 000, 2005

Geodätische Grundlagen: Geodätisches Datum: Potsdam-Datum (Fundamentalpunkt Rauenberg)
Bezugsfläche: Bessel-Ellipsoid 1841, Abbildung: Gauß-Krüger-Abbildung
Koordinaten: Gauß-Krüger-Koordinaten und Geographische Koordinaten, bezogen auf Potsdam-Datum

Bildnachweis: LfU, U. Teipel (Titelbild: Blick über das Chamb-Tal mit Kies-Abbau im Tal und Granit-Steinbruch im Vordergrund, im Hintergrund der bewaldete Gibacht-Höhenzug aus Gneisen)

Druck: Landesamt für Vermessung und Geoinformation, München 2011

Copyright: © Bayerisches Landesamt für Umwelt
Nachdruck, Vervielfältigung auf fotomechanischem oder ähnlichem Weg sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Geol. Kt. Bayern 1 : 25 000	6742	Augsburg 2011

QUARTÄR

Holozän

- Künstlich verändertes Gelände — ,,vö
- Künstliche Ablagerungen — ,,vä
- Mineralische Überdeckung
  als Übersignatur; Torfvorkommen mit künstlicher, mineralischer Überdeckung (Bodenmelioration)
- Anmoor
  z. T. entlgtes Niedermoor — ,Hnr
- Niedermoortorf
  z. T. zersetzt; z. T. mit künstlicher, mineralischer Überdeckung — ,Hnf
- Flussrinne
  Flussbett der Chamb vor der Regulierung im 20. Jahrhundert
- Jüngste Auenablagerungen (Jüngste Postglazialterrasse)
  Schluff und Feinsand, meist > 0,3 m über Kies — qhj3,,
- Jüngere Auenablagerungen (Jüngere Postglazialterrasse 2)
  Schluff und Feinsand, meist > 0,3 m über Kies — qhj2,,
- Ältere Auenablagerungen (Jüngere Postglazialterrasse 1)
  Schluff und Feinsand, meist > 0,3 m über Kies — qhj1,,
- Auenablagerungen, ungegliedert
  Schluff und Feinsand meist > 0,3 m über Kies — qhj,,
- Flussschotter, alt- bis mittelholozän (Ältere bis mittlere Postglazialterrasse)
  meist mit Feinsedimentauflage > 0,3 m — qha-m,G
- Flussschotter, altholozän (Ältere Postglazialterrasse) — qha,G

Pleistozän bis Holozän

- Bach- oder Flussablagerungen — ,f
- Talfüllung, polygenetisch
  Lehm oder Sand, z. T. kiesig — ,,ta
- Fächer oder Kegel
- Abschwemmmassen
  Lehm oder Sand — ,,sl

Pleistozän

- Flugsand
  sandig bis schluffig, z. T. umgelagert innerhalb von Fließerden und durch Abschwemmung — ,Sf
- Löß, karbonatfrei
  Schluff, feinsandig — ,Ul,a
- Fließerde
  Lehm, sandig, z. T. steinig bis blockig — ,fl
- Wanderschutt, blockreich
  gerundete bis kantengerundete, dm bis 2 m große Blöcke, meist in lehmig-sandiger Matrix, stellenweise komponentengestützt — ,fl,G
- Flussschotter, pleistozän
  Kies, sandig, steinig — qpm-s,G
- Flussschotter, unter- bis mittelpleistozän
  Kies, sandig, z. T. verlehmt, z. T. als Windkanter — qpm-s,G

Pliozän bis Pleistozän

- Flussand, ? pliozän bis pleistozän
  Sand, z. T. kiesig — pl/qp,S
- Geröllstreu
  als Übersignatur; Geröllstreu auf Fließerde und Gneisen, zwischen Chammünster und Wölsting, sowie E Satzdorf
- Verwitterungslehm — ,Lv
- Zersatzzone
  als Übersignatur
- Zersatzlehm — ,Lz

TERTIÄR bis QUARTÄR

Variszisches Grundgebirge

Tektonite

KARBON

Rundinger Zone

- Mylonit
  Meso- bis Ultramylonite, meist dunkelgrau; mittelkörnig bis dicht, straff foliiert; z. T. mit bis 5 mm großen Feldspat-Augen und -Blastern; z. T. Hell-Dunkel-Bänderung im mm-Maßstab — RZ,My
- Mesomylonit
  überwiegend dunkelgrau, augig, meist feinkörnig-dichte Grundmasse, mit 2 - 10 mm großen Feldspat-Augen oder -Blastern; Ausgangsgesteine z. T. Granite (z. B. NE Cham), z. T. dunkelsickte Gneise (z. B. Meinzing) — RZ,MMy
- Leukokrater Mylonit
  hellgrau, feinkörnig bis dicht, straff foliiert — RZ,MMy

OBERKARBON bis TRIAS

Mineralgänge

a) Quarz-Gang
b) Quarz-Gang-Einschaltung — a) ,qrg; b) ,qrg

Quarz-Gangbreccie
hydrothermal, mehrphasig — ,qrGbr

Variszische Magmatite

Ganggesteine

KARBON bis PERM

Aplit — ,A

a) Pegmatit
z. T. mit bis 2 cm großen Muskoviten, z. T. mit Schörl
b) Pegmatit-Einschaltung — a) ,Pe; b) ,pe

Plutonite

a) Granit, fein- bis mittelkörnig
Biotit überwiegt gegenüber Muskovit; z. T. porphyrisch mit bis 2 cm großen Feldspat-Einsprenglingen; z. T. Rießregelung; z. T. deformiert
b) Einschaltung von Granit, fein- bis mittelkörnig — a) ,Grfm; b) ,grfm

Granit
überwiegend hellgrau; proto- bis mesomylonitisch und/oder kataklastisch deformierte Granite; z. T. augig oder porphyrisch — ,Gr

OBERPFÄLZER WALD
Waffenbrunn
Wilmering
CHAM
Bruckwiesen
Iserhof
Pienendorfer Weiher
Wiesden
Chammünster
Chammünster Feld
Regen
Arnschwang
Weiding
Irlweser Wiesen
Dalkinger Tratt
Rundinger Forst
Rundinger Wiesen
Rundinger Weiher
Rundinger Bruch
Rundinger Moos
Rundinger Filz
Rundinger Hochholz
Rundinger Hochholz Weiher
Rundinger Hochholz Wiesen
Rundinger Hochholz Filz
Rundinger Hochholz Moos